

FJÄLLVETERINÄRENS FÖRSTA HJÄLPEN



Lövbergavägen 8 • 833 35 Strömsund
Mobil 076-109 91 88 • fjallveterinaren.se

Om olyckan skulle vara framme.

Var lugn och överblicka situationen. Finns det ytterligare fara? Bedöm skadan. Kontrollera medvetande, andning och cirkulation. Ge första hjälpen, kontakta veterinär snarast.

Medvetande: Är hunden kontaktbar och reagerar på omgivningen? I så fall behövs ingen HLR. Kontrollera hundens pupillreflexer med ficklampa vid misstanke om trauma mot skallen eller vid förgiftningar.

Andning: Andas hunden? Titta på buk och bröstorg och avgör andningsdjup och frekvens. Normal andningsfrekvens för hund i vila är mellan 10-30 andetag per minut. Lyssna efter biljud/rassel. Sörj för fria luftvägar.

Cirkulation:

Pulsen kontrolleras enklast högt upp på lårets insida. Normal puls är 80-120 slag per minut.

Bedöm slemhinnornas färg i ögon och munhåla. Normal färg är rosa. Blek/grå slemhinnor är tecken på cirkulationsvikt. Röda slemhinnor kan vara tecken på infektion. Tryck med tummen på läppens insida eller på tandköttet. När du lättar på trycket ska vävnaden återfå sin normala färg inom 1-2 sek.

Hjärt-lungräddning:

Lägg den medvetslösa hunden på höger sida. Böj huvudet försiktigt bakåt så att luftvägarna frias. Dra tungan åt sidan och rensa nos och svalg från ev. blod, slem eller andra föremål. Kontrollera puls och andning.



Vid hjärtstillestånd och andningsuppehåll: Tryck hårt mot bakre nedre delen av bröstkorgen 3-4 gånger för att stimulera både hjärta och lungor. Kontrollera puls och andning. Vid fortsatt hjärtstillestånd, inled HLR genom att först blåsa in luft genom hundens nos. Håll en hand runt nosen så att inte luften pyser ut genom munnen. Titta på bröstkorgen så att den höjer sig. Anpassa luftmängden efter hundens storlek. Blås in 5 andetag. Börja sedan hjärtkompressionerna genom att trycka med handflatorna mot bröstkorgen strax bakom/ovanför armbågen. Tryck "lagom" hårt 30 gånger. Växla mellan andning och hjärtstimulering. Kontrollera då och då spontan puls och andning.

Akuta tillstånd

Chock: Ett livshotande tillstånd där blodtrycket sjunker och cirkulationen av blod och syre kraftigt försämras. Detta kan bl.a. bero på inre eller yttre blödningar, psykiska reaktioner på traumatiska händelser, förgiftningar, uttorkning eller kraftig smärta. Hunden behöver snabbt dropp och värme.

Symtom: bleka slemhinnor, snabb svag puls, hög andningsfrekvens.

Akuta åtgärder vid chock: Vila, värme, akut transport till veterinär.

Trauma/sårskador

Vid kraftig blödning: Lägg tryckbandage och håll djuret i stillhet med den skadade kroppsdelens i högläge på väg till veterinär. Var försiktig vid förflyttning av hundar som kan misstänkas ha frakturer på rygg tex efter bil- eller fallolyckor. Var observant på symtom på chock.

Kramper: Kan hos hund ha flera orsaker och bör utredas av veterinär.

Akuta åtgärder vid krampanfall: Håll hunden mörkt, lugnt och tyst. Tänk på att en hund som krampar blir väldigt rädd och kan bitas.

Förgiftning: Rådgör alltid med veterinär eller giftinformationscentralen om du misstänker att din hund har ätit något olämpligt. **Giftinfocentralen 08-33 12 31**

Magomvridning:

Drabbar ofta djupbröstade raser. Hundens egen magsäck kommer i pendling och roterar så att passagen från strupe och tarm täpps till. Maginnehållet kan varken kräkas upp eller gå vidare ut till tarm och börjar jäsa varvid magsäcken fylls med gas. Hunden får en akut cirkulatorisk chock och har mycket ont - en akut slö hund med svullen buk, försöker ofta kräkas utan att få upp någonting. **Mycket akut!!** Hunden kan dö inom några timmar.

Ormbett/getingstick: Ormbett ska alltid tas på allvar och hunden ska transporteras akut till veterinär. Håll hunden i stillhet så att inte giftet sprider sig. Getingstick är oftast ofarliga om inte svullnaden uppstår runt luftvägarna. Svullnad vid getingsticket akutbehandlas med kortison ex. Betapred (0,5 mg tabl) 1 tabl/2 kg som akutdos vid allergisk reaktion inför transport till veterinär.

Överhettning: Kom ihåg att värmen kan vara farlig för våra hundar. Lämna aldrig en hund i bilen. Vid överhettning, kyl framförallt huvud, buk och tassar gärna med vatten.

FJÄLLVETERINÄRENS FÖRSTA HJÄLPEN



Fjällveterinärens råd vid sårskador:

Bitskador blir alltid mer eller mindre infekterade. Ibland behövs antibiotikabehandling. Infekterade sår rengörs gärna med jodopax eller klorhexidin. Behöver såret sys, bör det göras inom 8 timmar.

Vid kraftig blödning: Lägg tryckbandage och håll djuret i stillhet med den skadade kroppsdelens i högläge på väg till veterinär. Kontrollera cirkulationen genom att titta på djurets slemhinnor i ögon eller insidan av läpp/tandkött. Vid cirkulationssvikt blir slemhinnorna bleka. Puls kontrolleras lättast på insidan av låret. Hundens normaltemp är ca 37-38 grader.

Tassbandage:

- Tvätta eventuella sår och lägg en steril kompress närmast såret
- Lägg bomullssträngar mellan tårna för att undvika hudirritation till följd av att bandaget blir för tätt.
- Lägg ett lager bomull runt hela tassens upp till hand- respektive hasled.
- Avsluta med ett skyddande lager självhäftande bandage, typ "vetrap power wrap".



Lövbergavägen 8 • 833 35 Strömsund
Mobil 076-109 91 88 • fjallveterinaren.se

Viktiga telefonnummer:

Fjällveterinären Strömsund:
0670-109 09
076-109 91 88

Dygnsjour Jämtland/Härjedalen
Östersunds djursjukhus:
063-13 40 00

Egna anteckningar: _____



Innehåll AKUTVÅRDSKIT

Desinfektionsservetter: Att tvätta dina händer med. Det är viktigt med god handhygien vid all sårvård.

Natriumklorid/sårtvätt: Skölj av och rengör såret från synlig smuts.

Jodopax: Spädes till tefärgad lösning. Bakteriedödande sårtvätt för infekterade sår/bitskador.

Sterila kompresser: Att använda vid sårtvätt och lägga närmast såret vid bandagering.

Bomullslinda: Läggs som polstring vid bandagering.

Självhäftande bandagelinda: Lindas ytterst för att skydda skadan.

Paraffinolja: 1ml/kg vid förstoppning.

