

Medvetande

En medvetetslöshet ska alltid tas på största allvar. Kontrollera medvetandet genom hundens svar på tilltal och genom att lysa in i hundens ögon – drar pupillerna inte ihop sig är hundens medvetande påverkat.

Agera lugnt och tyst kring en medvetlös hund. Se till att hunden har fria andningsvägar och stoppa eventuell blödning. Lägg hunden plant på sidan, sträck fram huvudet och dra försiktigt ut tungan. Transportera hunden varsamt och skyndsammast till veterinär.

Andning

Kontrollera alltid hundens andning först, eftersom andningen är livsviktig för att syresätta kroppens celler. Börja med att titta på hur hunden andas - normalt andas en hund i vila 10 till 30 andetag i minuten. Om hunden har svårt att andas eller inte andas alls ska andningsvägarna kontrolleras. Öppna munnen och dra ut tungan för att se till att inget blockerar luftens väg ner till lungorna. Om svalgöret inte är blockerat och hunden fortsatt inte andas påbörjas konstgjord andning. (se sid. 2-3)



Fjällveterinären

0670 109 09

4

och upprepa ett flertal gånger. Växla mellan andning och hjärtstimulering. Kontrollera hela tiden puls och andning.

Chock är ett livshotande tillstånd där blodtrycket snabbt sjunker och cirkulationen mycket akut försämras. Symtom på chock är bleka slemhinnor, en snabb svag puls och en hög andningsfrekvens. En chockad hund behöver SNARAST transporteras till veterinär för att få akut vård. Under transporten ska hunden hållas i stillhet, lugnas och (undantaget värmeslag) bäddas in.



Fjällveterinären

0670 109 09

3

Cirkulation

Det är viktigt att stoppa blödningar snabbt. Då ett större kärl skadas, framförallt artärer med högt blodtryck, finns det risk att hunden förblöder. I första hand läggs ett tryckbandage direkt mot såret – ta vad som finns att tillgå i din närhet. Vid svårare blödningar ska du stasa = snöra åt med vad som finns att tillgå strax ovanför blödningen.

Vid sparkskador eller trafikolyckor är inre blödningar inte ovanliga. En sådan blödning orsakar en minskad mängd blod i blodkärlen och stor risk för chock. Kontrollera därför alltid hundens puls och slemhinnor för att bedöma cirkulationen i en akut situation.


Pulsen hittar du lättast i ljumsken. Lägg fingrarna högt upp i ljumsken och flytta fingrarna nedåt tills du känner pulsen, normalt för hund i vila 80 till 120 slag per minut. Slemhinornas färg ger ett bra mått på hundens cirkulation. Tryck ett par sekunder på slemhinnan i munnen, släpp och kontrollera hur lång tid det tar innan färgen återvänder, normalt ett par sekunder.



Fjällveterinären

0670 109 09

5



Viktiga telefonnummer:

Fjällveterinären Strömsund

0670-109 09

076-109 91 88

Dygnsjour Jämtland/Härjedalen

Östersunds djursjukhus

063-13 40 00



Fjällveterinären

0670 109 09

Hjärtlungräddning

Lägg den medvetelösa hunden på höger sida. Böj huvudet bakåt för fria luftvägar. Dra försiktigt tungan åt sidan och rensa svalg från blod, slem eller andra föremål. Kontrollera puls och andning. Vid hjärtstillestånd, inled HLR genom att försiktigt blåsa in luft genom hundens nos. Håll en hand runt nosen så att inte luften pyser ut genom munnen. Titta på bröstkorgen så att den höjer sig. Blås in några andetag och påbörja sedan hjärtkompressioner genom att trycka med handflatorna mot bröstkorgen strax bakom/ovanför armbågen. Tryck bestämt men försiktigt



Fjällveterinären

0670 109 09

2



Första hjälpen för hund

Några akuta tillstånd hos hund – så agerar du!

Sårskador

Vid större sårskador är det viktigast att stoppa blödning snabbt. Lägga ett tryckförband mot såret och snör åt/stasa ovanför blödningen. Uppsök veterinär skyndsammast.

Mindre sårskador läker på tio dagar under förutsättning att de hålls rena och torra. Ett sår ska alltid rengöras så fort som möjligt. Hunden ska inte slicka på såret. Ett större sår bör sys inom åtta timmar.

Bitsår är alltid infekterade varför det är nödvändigt att tvätta med en bakteriedödande lösning. Om såret sitter nära eller i en led ska veterinär rådfrågas.

Tassbandage

- » Tvätta tasserna och lägg en steril kompress närmast såret.
- » Lägga bomullssträngar mellan tårna för undvika irritation till följd av att bandaget blir för tätt.
- » Lägga ett lager bomull runt hela tasserna upp till och över handloven.
- » Avsluta med ett skyddande lager självhäftande bandage (ex vet wrap).
- » Sätt på en tassocka för att skydda mot smuts och väta.

Ögonskador

Ögonskador är alltid akuta och bör som regel veterinärundersökas snarast. Vid en sårskada på ögat kniper hunden med det skadade ögat. Genom att skölja ögat rikligt med koksalt lösning i fält kan eventuella främmande föremål som gräsfrön avlägsnas. Efter sköljning skyddas ögat med ögongel.

Magomvridning

Magomvridning är bland det mest akuta våra hundar kan råka ut för och kräver omedelbar veterinärvård. Den typiska bilden av är en plötsligt slö hund med svullen buk och tydliga tecken på chock. Magomvridning innebär att en fylld magsäck kommer i självpendling och roterar så att det tar tvärstopp i magtarmkanalen. Magsäcken börjar snabbt fyllas av gas, trycket ökar på omkringliggande organ och den livshotande chocken är ett faktum.

Ormbett

Misstänker du att din hund blivit huggormsbiten ska hunden omgående åka till veterinär!

I akutskedet är det svullnaden som är farlig, men det är effekterna från ormens gift som är livsfarligt. En till synes pigg hund kan utveckla allvarliga symtom från hjärta och njurar långt efter bittet. Håll den bitna hunden i stillhet under transporten, bär den om möjligt och rör inte bittet område.

Getingstick

Ett getingstick orsakar en akut ömmande svullnad. Kyl akut för att minska svullnaden. Kortison tabletter kan med fördel ges till en getingstucken hund – dock alltid i samråd med veterinär. Visar din hund tecken på chock ska den omedelbart transporteras till veterinär.

Förgiftningar

Kontakta alltid veterinär akut för råd om du misstänker att hunden ätit något giftigt. Försök inte att ge hunden salt då detta i många fall istället orsakat saltförgiftning. Kräkning görs hos veterinär upp till två timmar efter intag av något olämpligt. Observera dock att kräkning exempelvis inte ska utlösas om hunden ätit i sig något frätande eller vasst.

Värmeslag

Tecken på värmeslag är en våldsam flåsande hund med vidöppen mun som betar sig oroligt, vinglar, kräks och till och med drabbas av kramper. Om du misstänker värmeslag ska veterinär snarast möjligt uppsökas.

Eftersom kroppstemperaturen stiger okontrollerbart vid värmeslag är det viktigt att kyla hunden försiktigt. Kyl först huvudet och massera sedan benen för att stimulera blodcirkulationen.